

消毒水泡製方式(影音檔(請於影音檔區))

一. 準備物品:

1. 市售漂白水含次氯酸鈉濃度約以 5%計算
2. 免洗湯匙，一湯匙約為 20cc。
3. 大寶特瓶，如可樂瓶，1 罐容量約為 1250cc。
4. 手套及口罩

二. 用途及配製方法

用途	濃度	配製方法	備註
洗手用	100ppm	10cc 漂白水 + 5 公升清水 (免洗湯匙半匙) (4 瓶大瓶寶特瓶)	大寶特瓶 1 罐約
擦拭桌面及物品表面用	200ppm	20cc 漂白水 + 5 公升清水 (免洗湯匙 1 匙) (4 瓶大瓶寶特瓶)	1250ml
牆壁、地面、馬桶等較髒污處，或嘔吐物之處理	500ppm	50cc 漂白水 + 5 公升清水 (免洗湯匙 2.5 匙) (4 瓶大瓶寶特瓶)	免洗湯匙 1 匙約 20ml

三. 使用漂白水注意事項

1. 使用口罩、橡膠手套和保護眼睛以避免被噴濺到。
2. 在通風良好處配製和使用漂白水。
3. 使用冷水稀釋，因為熱水會分解次氯酸鈉並降低其消毒效果。
4. 漂白水會腐蝕金屬及破壞油漆表面。
5. 避免接觸眼睛。如果漂白水濺入眼睛，須以清水沖洗至少 15 分鐘及看醫生。
6. 不要與其他家用清潔劑一併或混和使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。
7. 當漂白水和其他酸性清潔劑(如一些潔廁劑)混合時，會產生有毒氣體，可能造成傷害或死亡。如有需要，應先使用清潔劑並用水充分清洗後，才用漂白水消毒。
8. 未稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，所以應放置於陰涼及兒童碰不到的地方。
9. 由於次氯酸鈉會隨時間漸漸分解，因此宜選購生產日期較近的漂白水，並且不要過量儲存，以免影響殺菌功能。
10. 若要使用稀釋的漂白水，應當天配製並標示日期名稱，而未使用的部分在 24 小時後應丟棄。